



مشاوره تحصیلی تمصیلیکو

مشاوره تخصصی ثبت نام مدارس ، برنامه ریزی درسی و
آمادگی برای امتحانات مدارس

برای ورود به صفحه مشاوره مدارس کلیک کنید

تماس با مشاور تحصیلی مدارس

۹۰۹۹۰۷۱۷۸۹



تماس از تلفن ثابت

نام و نام خانوادگی:
 مقطع و رشته: یازدهم ریاضی
 نام پدر:
 شماره داوطلب:
 تعداد صفحه سؤال: ۲ صفحه

جمهوری اسلامی ایران
 اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران
 اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه ۲ تهران
 دبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانش واحد سعادت آباد
آزمون پایان ترم نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

نام درس: حسابان ۱
 نام دبیر: کامیار قاجار
 ساعت امتحان: ۸ صبح / عصر
 مدت امتحان: ۱۱۰ دقیقه

شماره سؤال	سؤالات	نمره به عدد:	نمره به حروف:	نام دبیر:	تاریخ و امضا:
			نمره به عدد:		
۶	<p>دامنه توابع زیر را بیابید.</p> <p>الف) $y = \sqrt{[2x] - 3/1}$</p> <p>ب) $y = \frac{1}{[x] + [-x + 1]}$</p> <p>ج) $y = \sqrt{\frac{x-4}{(x-5)(x-6)}}$</p> <p>د) $y = \sqrt{(x-4)^2(-x^2+3x)}$</p>	۱			
۶	<p>معادلات زیر را حل کنید.</p> <p>الف) $\left[\frac{x+1}{x-2}\right] = 3$</p> <p>ب) $\sqrt{x-2} + \sqrt{2x} = 2$</p> <p>ج) $(x-1)(x+1)(x-4) = (x^2-1)$</p> <p>د) $x^2 + 2x + 10 = (x+1)^2$</p>	۲			

اگر نقاط A و B و C سه رأس مثلث ABC باشند، مطلوبست:

۳	<p>(۱) معادله میانه و طول میانه وارد بر ضلع BC مشاوره تحصیلی تحصیلیکو</p> <p>(۲) معادله ارتفاع و طول ارتفاع وارد بر ضلع BC</p>	۳
۲	<p>الف) $x_1^2 + x_2^2$</p> <p>ب) $\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2}$</p> <p>ج) $x_1^2 + x_2^2$</p> <p>د) $\sqrt{\frac{x_1}{x_2}} + \sqrt{\frac{x_2}{x_1}}$</p>	۴
۱	<p>وارون تابع زیر را بیابید.</p> $y = \begin{cases} 2x + 10 & x \geq 2 \\ 5x - 1 & x < 2 \end{cases}$	۵
۱	<p>ریشه های معادله ی زیر را بیابید.</p> $ x - 1 + x^2 = 4$	۶
۱	<p>نامعادله ی زیر را حل کنید.</p> $\frac{x}{ x - 1 } < 2$	۷
صفحه ی ۲ از ۲		

جمع بارم : ۲۰ نمره



ردیف	راهنمای تصحیح	محل مهر یا امضاء مدیر																									
۱	الف) $[2x] \geq 3.1 \rightarrow 2x \geq 4 \rightarrow x \geq 2$																										
	ب) $[x] + [-x] + 1 \neq 0 \Rightarrow x \in \mathbb{Z}$																										
	ج) $\frac{x-4}{(x-5)(x-6)} \geq 0$																										
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">۴</td> <td style="text-align: center;">۵</td> <td style="text-align: center;">۶</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">$x-4$</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">•</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">+</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">$x-5$</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">•</td> <td style="text-align: center;">+</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">$x-6$</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">•</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">+</td> </tr> </table>		۴	۵	۶		$x-4$	-	•	+	+	$x-5$	-	-	•	+	$x-6$	-	-	-	•		-	+	-	+	
	۴	۵	۶																								
$x-4$	-	•	+	+																							
$x-5$	-	-	•	+																							
$x-6$	-	-	-	•																							
	-	+	-	+																							
	$[4, 5] \cup (6, +\infty)$																										
	د) $(x-4)^2(-x^2+3x) \geq 0$																										
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">۰</td> <td style="text-align: center;">۳</td> <td style="text-align: center;">۴</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">$-x^2+3x$</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">•</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">•</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">$(x-4)^2$</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">•</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </table>		۰	۳	۴		$-x^2+3x$	-	•	+	•	$(x-4)^2$	+	+	+	•		-	+	-	-						
	۰	۳	۴																								
$-x^2+3x$	-	•	+	•																							
$(x-4)^2$	+	+	+	•																							
	-	+	-	-																							
	$[0, 3] \cup \{4\}$																										
۲	الف) $3 \leq \frac{x+1}{x-2} < 4$																										
	$\frac{x+1}{x-2} \geq 3 \Rightarrow \frac{x+1}{x-2} - 3 \geq 0 \Rightarrow \frac{x+1-3x+6}{x-2} \geq 0$																										
	$\Rightarrow \frac{-2x+7}{x-2} \geq 0 \Rightarrow$																										
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">۲</td> <td style="text-align: center;">۷/۲</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">$-2x+7$</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">•</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">$x-2$</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">•</td> <td style="text-align: center;">+</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </table>		۲	۷/۲		$-2x+7$	+	+	•	$x-2$	-	•	+		+	-	-										
	۲	۷/۲																									
$-2x+7$	+	+	•																								
$x-2$	-	•	+																								
	+	-	-																								
	$\frac{x+1}{x-2} - 4 < 0 \Rightarrow \frac{x+1-4x+8}{x-2} < 0$																										

$$\frac{-3x + 9}{x - 2} < 0$$

مشاوره تحصیلی **تحصیلیکو**

		۲	۳	
$-3x + 9$	+	+	•	-
$x - 2$	-	•	+	+
	-	+		-

$$\left(\frac{7}{2}, 3 \right)$$

ب) $\sqrt{x-2} = 2 - \sqrt{2x} \rightarrow x - 2 = 4 + 2x - 4\sqrt{2x}$

$$4\sqrt{2x} = 6 + x \rightarrow 32x = 36 + x^2 + 12x$$

$$\Rightarrow x^2 - 2x + 36 = 0$$

$$(x - 2)(x - 18)$$

$$\begin{cases} x = 2 \\ x = 18 \end{cases}$$


ج) $(x-1)(x+1)(x-4) = (x-1)(x+1)$

$$x = 1$$

$$x = -1$$

$$x = 0$$

د) ∞ ریشه



BC وسط M

$$A_m = \frac{2}{2} = 1 \Rightarrow y - 0 = 1(x - 1) \quad \text{میانۀ } Am$$

$$|Am| = \sqrt{\frac{9}{4} + \frac{9}{4}} = \frac{\sqrt{18}}{2} \quad \text{طول میانۀ } Am$$

www.Tahsilico.com

قسمت دوم سوال ۳

A

۳

$$MBC = \frac{1-2}{2-1} = -1$$

B H C

$$m_{AH} = 1 \rightarrow y - 0 = 1(x - 0) \quad \text{معادله ارتفاع AH}$$

$$\text{BC معادله: } \Rightarrow y - 1 = +1(x - 2) \Rightarrow x + y - 3 = 0$$

$$AH = \frac{|0 + 0 - 3|}{\sqrt{2}} = \frac{3}{\sqrt{2}}$$

$$1) x_1^r + x_2^r = (x_1^r + x_2^r)^r - 2x_1^r x_2^r = (S^r - 2P)^r - 2P^r$$

4

$$2) \sqrt{x_1} + \sqrt{x_2} = \sqrt{(\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2})^2} = \sqrt{S + 2\sqrt{P}}$$

$$3) x_1^r + x_2^r = (x_1^r + x_2^r)^r - 2x_1^r x_2^r = (S^r - 2P)^r - 2P^r$$


$$4) \sqrt{\left(\frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1} + 2\right)} = \sqrt{\frac{S^r - 2P}{P} + 2}$$

$$y = 2x + 10 \rightarrow x = \frac{y-10}{2} \rightarrow y = \frac{x-10}{2}$$

5

$$y = 5x - 1 \rightarrow x = \frac{y+1}{5} \Rightarrow y = \frac{x+1}{5}$$

$$f^{-1} = \begin{cases} \frac{x-10}{2} & x > 14 \\ \frac{x+1}{5} & x < 9 \end{cases}$$



$$x \geq 1 \quad x^r + x - 1 = 4 \Rightarrow x^r + x - 5 = 0 \Rightarrow x = \frac{-1 + \sqrt{21}}{2}$$

6

$$x < 1 \quad x^r - x + 1 - 4 = 0 \Rightarrow x^r - x - 3 = 0 \Rightarrow x = \frac{1 - \sqrt{13}}{2}$$

7

$$\begin{cases} x \geq 1 & \frac{x}{x-1} < 2 \rightarrow \frac{x}{x-1} - 2 < 0 \\ x < 1 & \frac{x}{1-x} < 2 \rightarrow \frac{x}{1-x} - 2 < 0 \end{cases}$$

		1 +2	
-x + 2	+	+	-
x - 1	-	+	+
	<input type="checkbox"/>	+	<input type="checkbox"/>
$\frac{x - 2 + 2x}{1 - x} < 0 \Rightarrow \frac{3x - 2}{1 - x} < 0$			
	2	1	
3x - 2	-	+	+
1 - x	+	+	-
	<input type="checkbox"/>	+	<input type="checkbox"/>
امضاء:	نام و نام خانوادگی مصحح :		جمع بارم : ۲۰ نمره

Tahsilico